

Дифтерия

Поговорим о
дифтерии...



Дифтерия – острое инфекционное заболевание, при котором развивается фибринозное воспаление с образование плёнок в месте внедрения возбудителя (чаще на слизистых оболочках ротоглотки и дыхательных путей), и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой, нервной и мочевыделительной системы.

Пути передачи:

Передаётся возбудитель инфекции от человека к человеку воздушно-капельным путём при чихании, кашле, разговоре. Возможна передача возбудителя контактно-бытовым путём через предметы обихода и возникновение кожных форм дифтерии, что чаще отмечается в жарких странах.

Инкубационный период:

Длиться от 2 до 10 дней

Симптомы:

- Головная боль
- Слабость, недомогание
- Невысокая температура тела в начале заболевания
- Боли в горле при глотании
- Увеличение лимфатических узлов в области шеи
- Формирование плотного серовато-белого налета или пленки, спаянной со слизистой задней стенки глотки и верхних дыхательных путей

Осложнения:

При токсической форме дифтерии присоединяется озноб, рвота и боли в животе. Заболевание может протекать в молниеносной форме, и если не оказать врачебную помощь (в стационаре вводится специфическая сыворотка), больной умирает в течение 2-3-х дней.

Вакцинация:

Настоятельно рекомендуется прививаться против дифтерии в рамках Национального календаря профилактических прививок Республики Беларусь

Дети: Вакцинация осуществляется:

Детям в возрасте 2,3,4,18 месяцев и 6,11,16 лет

Взрослым:

В возрасте 26 и каждые последующие 10 лет жизни до достижения возраста 66 лет.

По эпидемическим показаниям:

- Лица, не имеющие документально подтверждённых сведений о перенесённом раннее заболевании дифтерией, сведений о наличии профилактических прививок против дифтерии в соответствии с возрастом, и

лабораторных результатов, подтверждающих наличие защитного титра (концентрации) противодифтерийных антител.

- Лицам, находящимся в контакте с пациентом, которому установлен диагноз «дифтерия»
- Лица, у которых со времени последней профилактической прививки против дифтерии прошло уже более 5 лет
- Дети, у которых наступил срок очередной профилактической прививки против дифтерии

Почему важна вакцинация:

Вакцинация позволяет создать длительный и напряжённый антитоксический иммунитет. В последние годы благодаря массовой вакцинации заболеваемость дифтерией и носительство токсигенных коринебактерий находится стабильно на низком уровне. Так же благодаря вакцинации в случае развития дифтерии, привитые переносят её в лёгкой форме и без осложнений. Саму прививку против дифтерии делают в поликлиниках по месту жительства, медицинских кабинетах в детских садах, школах.

Врач-эпидемиолог

С.Г.Белашова